



Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu:

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium



*30. – 31. května 2014
Městské divadlo Český Krumlov*

Nemá váš pacient s ED také symptomy LUTS-BPH?



2 problémy 1 pacient

Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH.¹

První kombinovaná léčba ED a LUTS-BPH v jednom^{1,2,3}

- ✓ Prověřená účinnost
- ✓ Bezpečnost
- ✓ Minimální nežádoucí účinky
- ✓ Jistota, že pacienti mohou mít sex kdykoli přijde ta správná chvíle

Zkrácená informace o přípravku Cialis: **Název přípravku:** CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. **Léčiva látka:** Tadalafil 5 mg v tabletech. **Indikace:** Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafilu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba zrněnek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. **Dávkování a způsob podání:** Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální celková dávka je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v příbлизně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má především předhodnotit. Benigni hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg užívána každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívána každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s ledvinou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutné úprava dávky přípravku. Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetesem není nutná úprava dávky přípravku. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na tadalafil nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s pre-existujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, anginzni bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) běhemposledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypertenze (>160/90 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta zraku na jednom oku z důvodu NAION. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Diagnostika erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem by měl být vyloučen vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnoceno kardiovaskulární stav. **Interakce:** U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzivní terapie. U pacientů užívajících alpha blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi. Pacienti s erektilní dysfunkcí déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba přípravku zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů typicky onemocněním, která mohou predisponovat ke vzniku pripisu. Opatrnost je třeba při předepsání přípravku CIALIS pacientům užívajícím nitroglycerin, sakinavir, ketokonazol, itraconazol, erythromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s tímto léky a látkami může pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjištěvána. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukozogalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafilu se nedoporučuje. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alpha blokátorem je zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejnižší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli mít svoji resku na přípravek CIALIS sfin, než budou řidiť motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. **Těhotenství a kojení:** CIALIS není indikován k použití u žen. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolesti hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírný zvýšený výskyt abnormální EKG, především sinusové tachykardie. Většina těchto abnormálních EKG nebyla spojená s výskytym nežádoucích účinků. **Doba použitelnosti, skladování:** 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. **Balení:** Blister v náspové skladáče obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Eli Lilly Nederland B.V, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. **Registrační číslo:** EU/1/02/237/007-008 **Datum revize textu:** 13.2.2013. **Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Jily: <https://www.lilly.cz/info/infault-page/vp0is> nebo se obraťte na zástupce Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobož. 162/394, 18600 Praha 8, tel. 234 664 111, fax: 234 664 891. Lék je vázan na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni 13.2.2013.**



2v1 ✓



1 x DENNĚ
5 mg

CZCL500280

Literatura: 1. SPC Cialis 5mg 2012. 2. Donatucci CF, et al. Efficacy and safety of tadalafil lonce daily: considerations for the practical application of a daily dosing option. *CMR* 2008; 24(12): 3369-3382. 3. Wisniewski R et al. Safety, efficacy and pharmacokinetic overview of low-dose daily administration of tadalafil. *J Sex Med* 2009; 6:2039-2048.





Pořadatel:

Česká společnost pro sexuální medicínu,
člen European Society for Sexual Medicine,
a Mladá fronta a. s., divize Medical Services

Ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP
a Okresním sdružením ČLK Český Krumlov

Organizační sekretariát a pronájem výstavní plochy:

Mladá fronta a. s., divize Medical Services

Šárka Topičová, e-mail: topicova@mf.cz, tel. 602 167 525

Daniela Dyková, e-mail: dykova@mf.cz, tel. 725 528 744

Generální partner:

Hlavní partneři:



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Lilly

Answers That Matter.

Pfizer

Pracujeme společně pro zdravější svět™

PRO.MED.CS
Praha a. s.



Program sympatiubla ČSSM 2014

Pátek 30. května 2014

Registrace: od 8.00

Slavnostní zahájení: od 8.45

ANDROLOGIE I: začátek 9.00

moderátor doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.

1. 9.00 Pohanka Michal: Plodnost mužů v ČR: aktuální data
2. 9.20 Zvěřina Jaroslav: Klinické aspekty azoospermie
3. 9.40 Žáková Jana: Spermabanka Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno – 20 let trvání
4. 10.00 Turčan Pavel, Pokorný Pavel: Trombofilní mutace v andrologické praxi

Přestávka: 10.20-10.40

FEMINOLOGIE I: začátek 10.40

moderátor MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM

5. 10.40 Vrzáčková Petra: Poruchy orgasmu žen v denní praxi. Directed masturbation, coital alignment technique
6. 11.00 Marešová Anna: Jak se rodí erotická pomůcka
7. 11.20 Fučíková Zuzana, Šimotová Petra: Nové neinvasivní zákroky v estetické gynekologii – rejuvenace zevního genitálu a vaginy

Přestávka: 11.40-12.00

FEMINOLOGIE II: začátek 12.00

moderátor doc. Dr. phil. PhDr. Laura Janáčková, CSc.

8. 12.00 Janáčková Laura: Partnerské vztahy včera a dnes
9. 12.20 Pastor Zlatko: Syndrom perzistentního sexuálního vzrušení u žen
10. 12.40 Karásková Kamila: Mýty o inkontinenci z pohledu fyzioterapeuta

Přestávka na oběd: 13.00-14.00

Berlin Chemie Menarini sympozium: začátek 14.00

Nové trendy v léčbě mužských sexuálních dysfunkcí

moderátor doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

11. Pastor Zlatko: Dopad mužských pohlavních dysfunkcí na párovou sexualitu
12. Šrámková Taťána: Léčba předčasné ejakulace dapoxetinem – zkušenosti z praxe
13. Zámečník Libor: Avanafil – nová léčba pro pacienty s erektilní dysfunkcí

ANDROLOGIE II: začátek 15.00

moderátor MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

14. **15.00** Zámečník Libor: Erektilní dysfunkce: symptom, nebo diagnostický závěr?
15. **15.20** Semrádová Kateřina: Výživa rodu Homo, dispozice ke vzniku cévních onemocnění v historii
16. **15.40** Adámková Věra: Cévní postižení, rizikové faktory kardiovaskulárních chorob a erektilní dysfunkce
17. **16.00** Pichlerová Dita: Sexuální dysfunkce u diabetiků a obézních

Přestávka: 16.20–16.40

ELI LILLY sympozium: začátek 16.40

moderátor MUDr. Pavel Turčan

18. Turčan Pavel: Tadalafil – zkušenosti s léčbou ED a LUTS-BPH z ambulantní praxe

ANDROLOGIE III: začátek 17.10

moderátor MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

19. **17.10** Šrámková Taťána: Onkologické příčiny erektilní dysfunkce, karcinom kolorekta a prostaty
20. **17.30** Kočárek Jiří: Kvalita života mužů po robotické radikální prostatektomii
21. **17.50** Broul Marek: Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii – 1000 radikálních, roboticky asistovaných prostatektomií
22. **18.10** Chovanec Michal: Sexuálně dysfunkce u závislých

SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM OD 19.00

Program sympatibula ČSSM 2014

Sobota 31. května 2014

Registrace: od 8.30

FEMINOLOGIE III: začátek 9.00

moderátor Mgr. Adéla Cápová

- 23. 9.00 Cápová Adéla: Na cestě za svobodou reprodukce
- 24. 9.20 Nováková Dana: Vaginální imunita, probiotické bakterie, vliv na přenos pohlavních chorob
- 25. 9.40 Tauwinklová Gabriela: Asistovaná aktivace oocyty

Přestávka: 10.00–10.20

FEMINOLOGIE IV: začátek 10.20

moderátor MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

- 26. 10.20 Čepický Pavel: Aktuální problémy hormonální antikoncepce
- 27. 10.40 Klapilová Kateřina: Hormonální antikoncepce a libido z evoluční perspektivy: hypotéza kongruence
- 28. 11.00 Kavanová Renata, Pastor Zlatko: Sexualita ženy v postmenopauze

Přestávka: 11.20–11.40

Pfizer sympozium: začátek 11.40

moderátor MUDr. Ondřej Trojan, FECSM

- 29. Šrámková Tatána: Erektální dysfunkce – stálá výzva pro lékaře i pacienty
- 30. Trojan Ondřej: Erektální dysfunkce, lingvistické otázky

Přestávka na oběd: 12.10–13.10

12.15 Valná hromada – výroční shromáždění ČSSM
renesanční krčma U Dřwau Maryí

ANDROLOGIE IV: začátek 13.10

moderátor MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

31. **13.10** Půlpán Zdeněk: **Matematické hodnocení validity dotazníků a skóre kvality sexuálního života**
32. **13.30** Havlíček Jan: **Role čichu v partnerských vztazích a sexualitě**
33. **13.50** Zrzavý Jan: **Chiméry, genomový imprinting a další šílené evoluční důsledky sexu**

Přestávka: 14.10–14.30

ANDROLOGIE V: začátek 14.30

moderátor MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

34. **14.30** Varikokéla – State of the art – úvod
35. **14.40** Stárka Luboslav: **Pohled na práci s odstupem času: Raboch, J. and L. Stárka: Hormonal testicular activity in men with a varicocele. Fertil. Steril. 22, 152 (1971)**
36. **15.00** Kubíček Vladimír: **Varikokéla: termografická, USG a Dopplerovská diagnostika**
37. **15.20** Holý Martin: **Žilní drenáž pánve, její patologie a terapie**
38. **15.40** Kubíček Vladimír: **Mikrochirurgická operace varikokély s peroperační mikrovaskulární Dopplerovskou kontrolou**
- 16.00** **Vyhlášení nejlepších prezentací podle hlasování auditoria, v kategoriích andrologie/feminologie; přednášející do 35 let, 35 – 50 let, nad 50 let, ceny rady ČSSM**

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

8 nejlepších prezentací bude odměněno publikací
The ESSM Syllabus of Sexual Medicine

Místo konání:

Městské divadlo Český Krumlov, Horní Brána 2, Český Krumlov

SPOLEČENSKÝ A DOPROVODNÝ PROGRAM

Varianta I.

KRUMLOVSKÉ TAJEMNO

– večerní prohlídka historického centra města objevující skrytá zákoutí Českého Krumlova, díky které po stopách místních legend a příběhů načerpáte informace o historii, architektuře i místních památkách. 30. 5. 2014 od 19.00 do 20.30 hodin

Varianta II.

JUNGIÁNSKY LADĚNÁ PROCHÁZKA MĚSTEM

– prohlídka města objevující „vnitřní krajinu“ míst/genius loci/makom zahrnující například témata Zlatý věk renesance; Krumlovské mikrosvěty aneb život měšťanů ve středověku nebo Fenomény barokní kultury. 30. 5. 2014 od 19.00 do 21.00 hodin

Koncert Janis Joplin Revival, 30. 5. 2013 od 20.00

Divadelní kavárna Ántré, Městské divadlo Český Krumlov

Registrační poplatky:

- lékař I (symposium) – 500 Kč
- lékař II (symposium + společenský večer) – 800 Kč
- sestra I (symposium) – 250 Kč
- sestra II (symposium + společenský večer) – 550 Kč
- student, důchodce (symposium) – 150 Kč

Při platbě na místě přírážka 100 Kč.

Účast na společenském večeru 300 Kč.

Registrační poplatek je nevratný. Přednášející registrační poplatek nehradí.

Registrační formulář naleznete na webových stránkách: www.kongres-medical.cz

Symposium je pořádáno dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci symposia získají kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester.

Ubytování:

Zájemci laskavě kontaktují Infocentrum Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 704 622-3, e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz




**MEDICAL
SERVICES**

Největší vydavatelství
zdravotnických titulů v ČR
a pořádatel kongresů,
konferencí a symposií





pro muže
Radost pro ženu

MODRASIL®
sildenafilu citras

Osvobození vztahu od problémů s EREKCI

Modrasil 50 mg, Modrasil 100 mg

Složení: Sildenafilum 50 a 100 mg v 1 potahované tabletě. **Farmakoterapeutická skupina:** Léky používané při poruchách erekce. **Indikace:** Léčba erektilní dysfunkce u mužů, pod kterou rozumíme neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou k umožnění pohlavního styku. Pro dosažení účinku sildenafilu je nezbytné sexuální drážnění. **Kontraindikace:** Známá precitlivělost na sildenafilil nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku, současně užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (amylnitrit) nebo nitráty, pacienti se závažnými kardiovaskulárními poruchami (nestabilní angina pectoris nebo závažné srdeční selhání), ztráta zraku v důsledku nearterické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), dále pak závažná jaterní porucha, hypotenze (TK < 90/50 mm Hg), cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu v nedávne anamnéze a hereditární degenerativní postižení sítnice (např. retinitis pigmentosa). **Nežádoucí účinky:** Bolest hlavy, závrať, poruchy vidění, změny barevného vidění, návaly, zdření nosní sliznice a dyspepsie. **Interakce:** Inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, erytromycin, cimetidin) snižují clearance sildenafilu, inhibitory HIV proteázy (ritonavir, saquinavir) výrazně zvyšují C_{max} a AUC sildenafilu, současně podání sildenafilu a ritonaviru sa nedoporučuje, grapefruitový džus způsobuje mírné zvýšení plazmatických hladin sildenafilu. Sildenafilil je schopen potencevat hypotenzní účinky nitrátů, souběžné podání sildenafilu s α -blokátory může vést k symptomatické hypotenzi. **Upozornění:** Sildenafilil není indikován k použití u žen a není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Nemocní by měli znát svoji reakci na sildenafilil dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Sildenafilil je třeba používat opatrně u pacientů s anatomickou deformací penisu (angulace, kavernozní fibróza nebo Peyronova choroba) nebo u pacientů s onemocněními, které predisponují k přiapismu (sprkovitá anémie, vícečetný myelom nebo leukémie). **Dávkování a způsob podání:** Doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně 1 hodinu před sexuální aktivitou. Podle účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 100 mg nebo snížit na 25 mg. Maximální doporučená dávka je 100 mg denně. Pokud je sildenafilil užít současně s jídlem, může dojít ke zpoždění nástupu účinku ve srovnání se stavem na lačno. U pacientů se závažnou poruchou ledvin nebo s poruchou jater (např. cirhóza) doporučujeme zahájit léčbu dávkou 25 mg. **Balení:** 4 potahované tablety po 50 mg, 4 a 8 potahovaných tablet po 100 mg. **Datum poslední revize textu:** 1. 8. 2012. S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. **Držitel rozhodnutí o registraci:** PRO.MED.CS Praha a. s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika.

013028818



*Děkujeme za podporu
všem vystavovatelům
a partnerům*

Generální partner:



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Hlavní partneři:

Lilly

Answers That Matter.



Pracujeme společně pro zdravější svět™

PRO.MED.CS
Praha a. s.

Vystavovatelé:



Medi  **fine**
akciová společnost

FERRING
PHARMACEUTICALS

Zkrácená informace o přípravku
Viagra 25, 50, 100 mg potahované tablety, Viagra 50 mg tablety rozpustné v ústech.

Léčivá látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 25, 50 nebo 100 mg sildenafilu ve formě sildenafilu citras. Jedna tableta rozpustná v ústech obsahuje 50 mg sildenafilum ve formě sildenafilu citras. **Indikace:** léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. **Dávkování a způsob podání:** K perorálnímu podání dospělým nad 18 let. **Potahované tablety** - Obvyklá doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. **Tablety rozpustné v ústech** - Obvyklá doporučená dávka je 50 mg, kterou je třeba užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou na lačno, po vložení do úst se tableta nechá rozpustnout a poté se spolkne s/bez zapití. Je třeba ji užít bezprostředně po vyjmutí z blistru. U pacientů vyžadujících dávku 100 mg se druhá 50mg tableta rozpustná v ústech musí užít až po úplném rozpnutí první tablety. **Obě lékové formy** - Maximální doporučená dávka je 100 mg denně. U nemocných s renální insuficiencí, insuficiencí jater a u nemocných, kteří současně užívají přípravky inhibující CYP3A4, se doporučuje zahájit léčbu dávkou 25 mg. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo s nitráty v jakékoli formě. Použití u pacientů, pro které není sexuální aktivita vhodná (např. nestabilní angina pectoris, závažné srdečné selhání). Závažná jaterní porucha, hypotenze (TK<90/50mm Hg), cévní mozková příhoda nebo infarkt myokardu v nedávné anamnéze a také známé hereditární degenerativní postižení sítnice (retinitis pigmentosa). U pacientů, kteří ztratili zrak v důsledku nearterické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). **Zvláštní upozornění:** Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl lékař posoudit kardiovaskulární funkci pacienta. Sildenafil zvyšuje hypotenzivní účinek nitrátů. Současné užití sildenafilu s jinými formami léčby erektilní dysfunkce se nedoporučuje. Při podání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory a u pacientů s anatomickou deformací penisu či s onemocněními, která je predisponují k priapismu, je třeba opatrnosti. V případě erekce, která přetrvává déle než 4 hodiny, by měl pacient vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Je nutné pacienta poučit, aby v případě jakékoliv náhle poruchy zraku přestal přípravek VIAGRA užívat a okamžitě vyhledal svého lékaře. Je třeba pečlivě uvážít podávání sildenafilu pacientům s poruchami srážlivosti krve nebo aktivní vředovou chorobou. Současné užívání sildenafilu s ritonavirem není doporučeno. Přípravek VIAGRA není indikován k použití u žen. Potahovaná tableta obsahuje laktózu. **Interakce:** Při současném podání s inhibitory CYP3A4 by měla být jako úvodní podána dávka 25 mg. **Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Nemocní by měli znát svoji reakci na přípravek Viagra dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky: bolesti hlavy a návaly, dyspepsie, poruchy vidění, změny barevného vidění, zduření nosní sliznice, závrate. **Předávkování:** V případech předávkování je nutno podle potřeby zavést standardní podpurná opatření, nelze předpokládat, že by dialýza zrychlila clearance. **Uchovávání:** Potahované tablety - Uchovávejte při teplotě do 30°C. **Tablety rozpustné v ústech** - Nevžaduje zvláštní teplotní podmínky. **Obě lékové formy** - Chráňte před vlhkostí (v původním vnitřním obalu). **Balení:** 2, 4, 8 nebo 12 tablet v blistru. **Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci:** Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie. **Registrační čísla:** Potahované tablety - EU/1/98/077/002-004, EU/1/98/077/006-008, EU/1/98/077/010-019. **Tablety rozpustné v ústech** - EU/1/98/077/020-023. **Datum poslední revize textu:** 23.1.2014. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se, prosím, seznámte s úplnou informací o přípravku.

Úplnou informaci pro předepisování obdržíte na adrese:

Pfizer, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
telefon: 283 004 111, fax: 251 610 270, www.pfizer.cz

V případě odborných dotazů volejte odbornou
informační službu společnosti Pfizer:

283 004 211



Pracujeme společně pro zdravější svět®

Pouze VIAGRA® je VIAGRA®

- ◆ Bylo prokázáno, že Viagra® poskytuje **optimální tvrdost erekce**^{1-3*}
- ◆ Léčba erektilní dysfunkce (ED) pomáhá obnovit **sebeúctu a sebedůvěru** pacienta⁴⁻⁸

VIAGRA®
(sildenafilum)

Pro pevné partnerské vztahy

Reference: 1. Mulholl J et al. Erectile dysfunction: Monitoring response to treatment in clinical practice – Recommendations of an international study panel. *J Sex Med* 2007;4:448-464. 2. King et al. Correlations between increased erection hardness and improvements in emotional well-being and satisfaction outcomes in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction. *Int J Impot Res* 2007;19:398-406. 3. Mulholl J.P. et al. Erection hardness: a unifying factor for defining response in the treatment of erectile dysfunction. *UROLOGY* 68 (Suppl 3A): 17-25, 2006. 4. Kadoglou et al. Quality of erections in men treated with flexible-dose sildenafil for erectile dysfunction: Multicenter trial with a double-blind, randomized, placebo-controlled phase and an open-label phase. *J Sex Med* 2008;5:726-734. 5. Althoff et al. Sildenafil citrate improves self-esteem, confidence, and relationships in men with erectile dysfunction: Results from an international, multi-center, double-blind placebo-controlled trial. *J Sex Med* 2006;3:521-529. 6. Dappellieri et al. Comparison between sildenafil-treated subjects with erectile dysfunction and control subjects on the self-esteem and relationship questionnaire. *J Sex Med* 2006;3:274-282. 7. Montorsi et al. Erection function and assessments of erection hardness correlate positively with measures of emotional well-being, sexual satisfaction, and treatment satisfaction in men with erectile dysfunction treated with sildenafil citrate (Viagra). *Urology* 2006;68:26-37. 8. Moncada et al. Emotional changes in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction: A double-blind, placebo-controlled clinical trial. *J Sex Med* 2009;6:3469-3477.

* U 76 % mužů, kteří užili přípravek Viagra 100 mg, bylo dosaženo EHS (stupeň tvrdosti erekce) 4 z původního EHS 3.

VGR-2013.02.024

Nový originální inhibitor PDE-5 k léčbě erektilní dysfunkce¹

Spedra[®]

avanafil

- Rychlý nástup účinku²
- Dlouhodobý erektoenní účinek²
- Nízký výskyt specifických nežádoucích účinků³



Zkrácená informace o přípravku Spedra® 50 mg, 100 mg, 200 mg. ▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. **Složení:** Avanafil 50 mg, 100 mg, 200 mg v jedné tabletě. **Indikace:** Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Aby byl přípravek účinný, je nutná sexuální stimulace. **Farmakodynamické vlastnosti:** Ve všech pivních studiích s avanafilem bylo procento úspěšných pokusů o pohlavní styk významně vyšší u všech dávek avanafilu v porovnání s placebem. Platí to pro všechny pokusy ve všech hodnocených časových intervalech po podání dávky. **Dávkování:** 100 mg přibližně 30 minut před sexuální aktivitou. V závislosti na individuální účinnosti a snášenlivosti lze dávku zvýšit na 200 mg nebo snížit na 50 mg. U pacientů s mírnou až středně závažnou hepatální insuficiencí by měla být léčba zahájena minimální účinnou dávkou a dávkování upraveno podle snášenlivosti. Přípravek se doporučuje užívat maximálně jednou denně. Pokud se přípravek užije s jídlem, může být nástup účinku pozdější než při užití na lačno. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na složky přípravku. Užívání organických nitrátů nebo donorů oxidu dusnatého. Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo život ohrožující arytmie v posledních 6 měsících. Klidová hypotenze (< 90/50 mmHg) nebo hypertenze (> 170/100 mmHg). Nestabilní angina pectoris, angina pectoris při pohlavním styku, městnavé srdeční selhání (NYHA 2 a vyšší). U pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární onemocnění, by měli lékaři před rozhodnutím o předepsání přípravku zvážit potenciální riziko srdečních příhod spojené se sexuální aktivitou. Závažná hepatální nebo renální insuficience. Ztráta oka v důsledku nearteriální přední ischemické neuropatie optického nervu. Vrozná degenerativní porucha sítnice. Užívání silných inhibitorů CYP3A4 (včetně ketokonazolu, ritonaviru, atazanaviru, klaritromycinu, indinaviru, itraconazolu, nefazodonu, nefinaviru, saquinaviru a telitromycinu). **Upozornění:** Před rozhodnutím o farmakologické léčbě je nutno zjistit anamnézu a provést lékařské vyšetření ke stanovení diagnózy erektilní dysfunkce a určit potenciální příčiny. Kardiovaskulární funkce - před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by lékaři měli posoudit kardiovaskulární funkci svých pacientů, protože sexuální aktivita je spojena s určitým stupněm rizika srdečních příhod. Avanafil má vazodilatační vlastnosti, které vedou k mírnému a přechodnému poklesu krevního tlaku. Pacienti s obstrukcí odtoku krve z levé komory, např. s aortální stenózou a zodiopatickou hypertrofickou subaortální stenózou, mohou být citliví na působení vazodilatační, včetně inhibitorů PDE5. Pripasmus - pacienti, u nichž dojde k erekci trvající 4 hodiny nebo déle, je třeba poučit, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Pokud není pripasmus ihned léčen, může dojít k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence. Avana-

fil by měl být používán s opatrností u pacientů s anatomickou deformací penisu (jako je angulace, kavernozní fibróza nebo Peyronieova nemoc) nebo u pacientů s onemocněními, které mohou vést k pripasmu (srpkovitá anémie, mnohočetný myelom nebo leukemie). Poruchy zraku - je nutné pacienta poučit, aby v případě náhle poruchy zraku přestal přípravek Spedra® užívat a neprodleně vyhledal lékaře. Účinek na krvácení - údaje o bezpečnosti podávání avanafilu pacientům s poruchami krvácivosti nebo aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici. Proto by měl být avanafil těmto pacientům podáván pouze po důkladném posouzení poměru přínosů a rizik. Zhoršení nebo náhlá ztráta sluchu - pacienti je třeba poučit, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestali užívat inhibitory PDE5, včetně avanafilu, a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Současné užívání alfa-blokátorů a avanafilu může vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi v důsledku aditivních vazodilatačních účinků. Opatření k současnému užívání alfa-blokátorů a avanafilu najdete v plném znění souhrnu údajů o přípravku (SPC). Bezpečnost a účinnost kombinací přípravku Spedra® s jinými inhibitory PDE5 nebo jinou léčbou erektilní dysfunkce nebyla zkoumána. Pacienti by měli být poučeni, aby přípravek Spedra® v takových kombinacích neužívali. Konzumace alkoholu v kombinaci s avanafilem může zvýšit možnost symptomatické hypotenze. Pacienti by měli být poučeni, že souběžné užití avanafilu a alkoholu může zvýšit pravděpodobnost hypotenze, závratí nebo synkopy. Lékaři by měli pacienty poučit, co mají učinit v případě příznaků posturální hypotenze. Avanafil nebyl hodnocen u pacientů s erektilní dysfunkcí vyvolanou poraněním páteřní míchy nebo jinými neurologickými poruchami a u pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí. Přípravek Spedra® má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem k tomu, že v rámci klinických studií s avanafilem byly hlášeny závratě a poruchy zraku, měli by pacienti znát své reakce na přípravek Spedra® před tím, než budou řídit nebo obsluhovat stroje. **Interakce:** V souhrnu údajů o přípravku jsou popsány interakce s nitráty, přípravky, které snižují systé-
mový krevní tlak, alfa-blokátory, dalšími antihypertenzivy, alkoholem, inhibitory, induktoři nebo substráty CYP3A4. **Nežádoucí účinky:** Časté: bolest hlavy, zrudnutí, kongescce nosní sliznice. Méně časté a vzácné viz plné znění souhrnu údajů o přípravku. **Balení:** 4, 8 tablet. **Držitel registrace:** Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko. **Reg. číslo:** EU/1/13/841/002-009. **Datum posledního revize:** 14. 2. 2014. Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. Léčivý přípravek Spedra® je vyráběn v licenci Vivus Inc. a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

1 SPC léčivého přípravku Spedra® 50 mg, 100 mg, 200 mg, poslední revize 14. 2. 2014
2 Goldstein I et al. J Sex Med 2012; 9(4): 1122-1133
3 Wang R et al. J Sex Med 2012; 9(8): 2122-9

SEP-10-2014

Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o., Komárkova 16, 148 00 Praha 4, tel.: 267 199 333, fax: 267 199 336, e-mail: office@berlin-chemie.cz
Od července 2014: Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 - Michle



BERLIN-CHEMIE
MENARINI