

Původní práce

Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru

Urgent cerclage for membrane sac prolapse in the 2nd trimester

Miroslav Gregor

Porodnická a gynekologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Korespondenční adresa: MUDr. Miroslav Gregor, Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Porodnická a gynekologická klinika, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, tel.: +420 495 832 776, e-mail: gregormiroslav@seznam.cz

Publikováno: 10. 9. 2020
Actual Gyn 2020, 12, 58

Přijato: 5. 9. 2020
ISSN 1803-9588

Akceptováno: 8. 9. 2020
© 2020, Aprofema s.r.o.



Článek lze stáhnout z www.actualgyn.com

Citujte tento článek jako: Gregor M. Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru. Actual Gyn. 2020;12:58

Insuficience děložního hrdla s prolabovaným vakem blan ve II. trimestru je vzácná, ale závažná těhotenská komplikace spojená s nepříznivou prognózou. Cílem naší práce bylo identifikovat přítomnost intraamniálních zánětlivých komplikací u těchto pacientek a dále zjistit interval mezi příjmem a porodem, efekt antibiotické terapie nebo cerkláže, porodní hmotnost při porodu, mortalitu a morbiditu novorozenců. Provedli jsme retrospektivní studii na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové mezi lety 2014 a 2020. U všech zařazených pacientek byla vstupně provedena amniocentéza s vyšetřením přítomnosti bakterií a hladiny interleukinu 6. Na podkladě výsledků byly pacientky rozděleny do čtyř skupin a byla jim podána antibiotika nebo provedena cerkláž. Ze všech pacientek 11 % mělo intraamniální

infekci (přítomnost bakterií + elevace interleukinu 6), 43 % mělo sterilní intraamniální zánět (pouze elevace interleukinu 6 bez přítomnosti bakterií), žádná pacientka neměla bakteriální kolonizaci (pouze přítomnost bakterií bez elevace interleukinu 6), 46 % bylo bez intraamniálního zánětu (bez přítomnosti bakterií a bez elevace interleukinu 6). Pacientky s intraamniální zánětlivou komplikací byly léčeny antibiotiky a nebyla u nich provedena cerkláž. U pacientek bez intraamniálního zánětu byla provedena cerkláž bez podání antibiotik. Pacientky s intraamniální komplikací oproti pacientkám bez intraamniálního zánětu měly velmi krátký interval mezi příjmem a porodem, podstatně nižší gestační stáří při porodu, podstatně nižší porodní hmotnost a výrazně vyšší neonatální mortalitu a morbiditu.